

## 임상 이비인후과 Quiz

동아대학교 의과대학 이비인후과학교실  
백정환 · 서세훈

1. 어렸을 적부터 간헐적인 우측 이류의 병력이 있던 15세 환자가 우측 두통과 미열을 주소로 내원하였다. 이학적 검사상 papilledema, cranial nerve의 장애 및 meningeal irritation sign은 없었다. 이 환자의 미열과 두통의 원인으로 가장 적합한 것은?

- ① Viral meningitis
- ② Epidural abscess
- ③ Serous labyrinthitis
- ④ Otitic hydrocephalus
- ⑤ Aseptic thrombosis of lateral sinus

Ref. : Cummings Otolaryngology Head & Neck Surgery p. 3005

2. 감각신경성 난청 어린이의 청력역치가 95 dB SPL(sound pressure level)일 경우 평균 65dB SPL의 강도를 이야기 할 때 이 환자가 20dB SPL의 signal로 듣기 위해서는 보청기의 gain이 얼마나 필요한가?

- ① 50dB
- ② 60dB
- ③ 75dB
- ④ 95dB
- ⑤ 115dB

3. 1년 전 안면신경 손상을 받은 환자에서 안면근육의 EMG 검사상 'electrical silence' 소견을 보인다면 적합한 facial reanimation 방법은?

- ① Facial nerve neurorrhaphy
- ② Facial nerve cable graft
- ③ Nerve transposition

④ Muscle transposition

Ref. : Cummings Otolaryngology Head & Neck Surgery p. 1077

4. 소아의 반복성 만성부비동염의 수술적 치료로서 가장 적합한 술식은?

- ① Maxillary antrostomies
- ② Turbinatectomies
- ③ Tonsillectomy & adenoidectomy
- ④ Antral lavage
- ⑤ Functional endoscopic sinus surgery

Ref. : Ear, Nose & Throat Journal 1991 : 70 : 35-39

5. Pyogenic granuloma에 관한 설명으로 적합한 것은?

- ① Pus를 형성한다.
- ② Pyogenic bacteria에 의한다.
- ③ True granuloma이다.
- ④ Neoplasia이다.
- ⑤ Lobular hemangioma와 유사하다.

Ref. : Cummings Otolaryngology Head & Neck Surgery p. 253

6. 52세된 남자가 5년간의 snoring 및 daytime somnolence를 주소로 내원하였다. 비강 소견은 정상이었으며 low soft palatal arch를 보이고 체중 130kg, 혈압 140/90, Hb 14.5, PaO<sub>2</sub> 80%였다. 이 환자의 검사 및 치료중 하지 않아야 할 것은?

- ① Weight reduction
- ② UPPP
- ③ CPAP

④ Polysomnogram

⑤ Muller's maneuver

Ref.: Otolaryngol Clin N Am 1990, 23 : 758

7. 식당에서 고기를 먹던 할아버지가 갑자기 숨을 못 쉬고, 소리도 못 지르고 쓰러졌다. 가장 먼저 시행해야 할 조치는?

- ① 머리를 아래로 숙이게하고 등을 두드린다.
- ② Index finger를 인두내에 넣고 음식물을 꺼낸다.
- ③ Heimlich maneuver를 시행한다.
- ④ Cricothyrotomy를 시행한다.
- ⑤ Tracheostomy를 시행한다.

Ref.: Cummings Otolaryngology Head & Neck Surgery p. 242.

8. 20세 남자가 야구공에 좌측 안구를 맞고 응급실로 내원하였다. 국소소견상 periorbital ecchymosis와 swelling, upward gaze limitation이 있었으며, Water's view에서 tear drop sign을 보였다. 이 환자에 대해 옳지 않은 것은?

- ① Forced duction test를 시행하여 양성이면 수술을 시행한다.
- ② 1-2주간 관찰하여 forced duction test 양성이면 수술을 시행한다.
- ③ Upward gaze limitation은 inferior rectus muscle, fat 등의 entrapment에 의한다.
- ④ 1-2주간 관찰하여 enophthalmos가 2mm이 상이거나 CT상 bony defect가 크면 수술을 시행한다.

Ref.: Cummings Otolaryngology Head & Neck Surgery p. 322.

9. 2일 전 후두전적출술과 좌측 경부파청술을 받은 환자에서 nasogastric tube feeding을 시작한 후 24시간이 지나자 Hemovac drainage의 양이 전날에 비해 5배로 증가되었다. 이 환자에서 맨 먼저 시행해야 할 처치는?

- ① Nasogastric tube feeding을 끊고, pressure dressing을 한다.

② Nasogastric tube feeding을 계속하면서 pressure dressing을 한다.

③ Nasogastric tube feeding을 증가시킨다.

④ 즉시 수술부위를 exploration한다.

Ref.: Cummings Otolaryngology Head & Neck Surgery p. 1422.

10. 다음 중 양측 성대마비에 의한 호흡곤란이 가능성이 가장 높은 환자는?

- ① Trigeminal neuralgia와 transient visual loss가 있는 27세 여자.
- ② Ptosis와 fatigability가 있는 45세 여자.
- ③ Virus 질환 후 progressive muscular weakness가 있는 55세 남자.
- ④ Amaurosis와 우측 intermittent muscular weakness가 있는 62세 여자.

퀴즈 해답	
문제번호	해답
1	②
2	①
3	④
4	⑤
5	⑤
6	②
7	③
8	①
9	①
10	③